

KIII 206



KIII 206



PAMIĘTNIK  
TOWARZYSTWA NAUK ŚCISŁYCH

W PARYŻU

---

Tom II

---

PARYŻ

NAKLADEM BIBLIOTEKI KORNICKEJ

1872

PAMIĘTNIK  
TOWARZYSTWA NAUK ŚCISŁYCH  
W PARYŻU

PARYŽ — DRUKARNIA BRACI ROUGE, DUNON I FRESNĚ. — GLICA DU FOUR ST-GERMAIN, 43.

PAMIĘTNIK  
TOWARZYSTWA NAUK ŚCISŁYCH

W PARYŻU

---

Tom II

---

PARYŻ

*NAKŁADEM BIBLIOTEKI KORNICKIEJ*

1872

## OD REDAKCYI.

Towarzystwo Nauk Ścisłych, zawiązane w Paryżu z początkiem 1860 r., przedstawia na widok publiczny drugi tom swoich Pamiętników. Dobór artykułów w nim zawartych, wyprowadzone na widownię nauki coraz nowe nazwiska autorów chcących uczestniczyć, co do téj części wiedzy, w nieustającym rozwoju piśmiennictwa naszego, przekonają najlepiej Czytelnika o pożyteczności przedsięwziętego przez Towarzystwo wydawnictwa i o skuteczności jego usiłowań. Dalsze powodzenie polega na gorliwości i wytrwałości współpracowników naszych i na uznanój zasadzie, że pożyteczna dla ogółu praca nie powinna i nie może pozostać bez materialnego poparcia tak samego ogółu, jak i dbałych o jego dobro pojedynczych osób.

Towarzystwo z otrzymanych dotychczas rezultatów, jakoteż ze stosunków już zawiązanych w myśl Art. 68-74 Ustawy (załączonej przy I<sup>ym</sup> Tomie Pamiętnika), nabyło przekonania że nie zbraknie w kraju i po za jego obrębem uczonych, mających gotowe lub zamierzone prace mogące być przedmiotem artykułów do Pamiętnika lub osobnych dzieł naukowych, którzy zechcą powierzyć utwory swe Towarzystwu celem osiągnięcia najskuteczniejszego sposobu ich spożytkowania. Z drugiej strony, Towarzystwo znalazło już nakładcę tak na dotychczasowe tomy swego Pamiętnika, jakoteż i na liczne dzieła tyczące się przedmiotów w zakres jego czynności wchodzących (spis tych dzieł zamieszczamy przy końcu tomu), w osobie swego Prezesa hr. Jana Działyńskiego, który będąc sam właścicielem jednego z najbogatszych naszych zbiorów naukowych w kraju, Biblioteki Kórnickiej, nie ustaje w tradycyjonalném swój rodzinie popieraniu piśmiennictwa krajowego, zwracając szczególną swą czujność, zgodnie z duchem czasu, w kierunku nauk ścisłych.

Towarzystwo szczerząc się z tych otrzymanych do téj pory obustronnych rezultatów, nie zaniedbuje jednak wszelkich starań około rozszerzenia i utrwalenia swych czynności: odwołuje się przeto o współdziałanie do wszystkich pracujących na niwie wiedzy rozumowanej bez względu na miejsce obecnego ich pobytu, ofiarując wszelką pomoc jakiej mu stanowisko jego udzielić dozwoli. Ofiaruje również swe usługi tym, którzyby w przyjętym a Ustawą Towarzystwa określonym kierunku, użyć chcieli środków jakimi na poparcie rozwoju naukowego w kraju rozporządzać mogą. Art. 43-46 i 54-61 Ustawy, określają dostatecznie sposób, w jaki Towarzystwo wywiązuje się z tego przyjętego przez siebie podwójnego zadania. Przedstawiają one pewną porękę obustronną: autorom, że dzieła ich w najstosowniejszy sposób spożytkowanemi zostaną przez udzielenie pomocy naukowej i materialnej na jaką stać Towarzystwo; wydawcom, że nakład ich użytym będzie na dzieła poprawne, przez specjalne komisye przedyskutowane.

Prace naukowe tak Członków Towarzystwa jak i uczonych na zewnątrz jego znajdujących się, wypełniły dwa tomy już wyszłe Pamiętnika; inne artykuły (których spis poniżej podajemy) przejrane i osądzone przez wybrane do tego komisye, stanowiąc będą tom III<sup>ci</sup>, którego druk rozpoczęty; do

dalszych tomów materiały niewątpliwie niebawem nadesłanemi zostaną. Redakcyja zwraca uwagę śledzących postęp nauki na pewien dział określony Art. 43, 3°. Ustawy, tyczący się sprawozdań z ruchu naukowego, odkryć i wynalazków i t.p. któren tylko przy współdziałaniu wszystkich chętnych korespondentów wypełnić potrafi. Niektóre dzieła naukowe, wychodzące w stosunku z Towarzystwem, są już krytycznie rozebrane, (jak w Tomie I<sup>m</sup> i II<sup>m</sup> przez Członków Sągaję i Gosiewskiego); lecz pożądanemi by bardzo były artykuły nadsyłane z różnych miejsc, gdzie się znajdują Członkowie korespondenci lub osoby przychylnie Towarzystwu, zawierające :

1° krytyczny rozbiór utworów piśmiennictwa krajowego lub zagranicznego w gałęzi nauk ścisłych lub ich zastosowań;

2° Sprawozdania z ruchu naukowego, z pism naukowych, z wykładów publicznych.

3° Wiadomości krytyczne o urządzeniach szkół i fakultetów, o metodach wykładu w nich używanych, o programach do jakich wykłady te stosować się winny.

4° Artykuły mogące służyć jako materiały do historii nauk ścisłych w Polsce.

5° W ogóle, wiadomości o potrzebach i wymaganiach miejscowych względem postępu naukowego.

Gdyby szanowni korespondenci przychylić się chcieli do życzenia Towarzystwa, nadsyłając tego rodzaju artykuły, byłoby to wszechstronną korzyścią dla czytelników i dla autorów; jedni mieliby oprócz nauczających rzeczy, wiadomości ogół interesujące, drudzy skierowaliby mogli swą działalność w kierunku najodpowiedniejszym potrzebom krajowym. Wreszcie samo pobieżne zawiadomienie nadsyłane przez czytelników, autorów lub księgarzy, o wyszłych dziełach, posłużyłoby mogło do utworzenia *Przeglądu Bibliograficznego* dopełniającego każdy tom *Pamiętnika*.

Przypominamy na koniec że termin ogłoszonego przez Towarzystwo w I<sup>m</sup> Tomie *Pamiętnika* konkursu « *Ocenienie prac matematycznych H. Wronskiego* » upływa 12<sup>go</sup> Lutego roku *przyszłego* 1873; prosimy zatem chcących się współtubięć, o nadesłanie tyczących się postawionego zadania artykułów, najdalej na ten termin. Nagrodę konkursową Towarzystwo naznaczyło w summie *tysiąca* franków. Nadmieniamy przytém że wszelkie artykuły publikowane w *Pamiętniku* otrzymują honoraryum, wynoszące od 50 do 80 franków od arkusza.

W Paryżu, 7 Marca 1872 r.

*Sekretarz Stały Towarzystwa Nauk Ścisłych,*

*Redaktor Główny Pamiętników*

WŁ. FOLKIEFSKI.

*Lokal tymczasowy Towarzystwa: 80 B<sup>te</sup>. Montparnasse, w Paryżu. Komunikacye naukowe mają być przesyłane Towarzystwu, na ręce Sekretarza stałego, pod powyższym adresem.*

## SPIS ARTYKUŁÓW NADEŚŁANYCH DO III<sup>go</sup> TOMU

### PAMIĘTNICA.

- 1) O Równaniach Różniczkowych częściowych jednoczesnych, przez Wł. Folkierskiego.
- 2) Teorya biegu prostoliniżnego cieczy i jćj zastosowania do teoryi rur wodociągowych. Prace p. Maurycego Levy, francuzkiego inżyniera Dróg i Mostów, wyłożone i rozebrane przez Feliksa Kucharzewskiego.
- 3) Turbina Fourneyrona, jćj teorya dokładna i uwagi praktyczne, napisał Wł. Kluger.
- 4) O Funkcyach symetrycznych, przez Wł. Gosiewskiego.
- 5) O Atomowości rodników pojedynczych i złożonych, z krótkim poglądem na teorye chemiczne ostatnich czasów, przez F. Dolińskiego.

. . . . .  
. . . . .



# KILKA UWAG O LICZBIE RÓŻNYCH WARTOŚCI

JAKIE FUNKCYA MOŻE PRZYBIERAĆ W SKUTKU PRZESTAWIEŃ ZMIENNYCH  
DO NIĘJ WCHODZĄCYCH.

PRZEZ

WŁ. GOSIEWSKIEGO.

Przedstawiono na posiedzeniu Towarzystwa d. 4 Sierpnia 1870 r.

## 1. Niech

$$v = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

będzie funkcją  $m$  zmiennych niezależnych. Jeżelibyśmy w miejsce tych zmiennych podstawili jakieś dowolne wartości, funkcyja  $v$  otrzymałaby odpowiednią wartość  $v_1$ ; a oznaczając szereg tych nowych wartości przez  $P_1$ , mielibyśmy równanie  $v_1 = f(P_1)$ . Może się trafić, że po podstawieniu innego jakiegoś szeregu  $P_2$ , obok równania  $v_2 = f(P_2)$ , będzie istniało drugie, mianowicie  $v_1 = v_2$ , lub co na jedno wychodzi,  $f(P_1) = f(P_2)$ . Gdy ilości składające oba szeregi  $P_1$  i  $P_2$  są te same, powiadamy, że równanie  $v_1 = v_2$  wtedy tylko za istniejące rozumiemy, jeżeli się utrzyma przy wszelkich wartościach ilości zmiennych. Gdyby zaś było  $v_1$  różne od  $v_2$ , różność ta nie przestaje istnieć, chociażby zamieniała się na równość, przy pewnych szczególnych wartościach tych zmiennych.

2. Z określenia równości i różności wartości funkcyi  $v$ , wypada, że wartości zmiennych w jej skład wchodzących nie wpływają bynajmniej na liczbę jej równych lub różnych wartości, z czego wynika:

a) że wartości funkcyi otrzymamy przestawiając tylko ilości zmienne,

b) że gdy ilości zmienne zwiążemy pewnemi warunkami, a mianowicie takimi, aby wszystkie były różne między sobą; przy takich ich wartościach uważane wartości funkcyi, pozostaną względem siebie takimi, jakimi by były przy wszelkich wartościach tych ilości zmiennych. Ponieważ równanie dwumienne

$$x^m - 1 = 0$$

ma  $m$  pierwiastków różnych, będzie dogodnie uważać nasze zmienne za pierwiastki tego równania.



3. Z powodu że z  $m$  ilości,  $1, 2, 3, \dots, m = m!$  wszystkich przemian utworzyć można, funkcyja  $v$  najwyższej  $m!$  różnych wartości przyjmuje. Pośród tych wartości funkcyj, równych sobie lub różnych poszukiwać będziemy. Aby zaś wszystkie te wartości otrzymać, potrzeba w funkcyi  $v$  za szereg zmienionych  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_m$  wszystkie  $m!$  przemian po kolei podstawić. Gdy więc w miejsce przemiany  $x_1, x_2, \dots, x_m$ , piszemy inną  $x_\alpha, x_\beta, \dots, x_\nu$ , (w szeregu liczb  $\alpha, \beta, \dots, \nu$ , wszystkie są między sobą różne, i stanowią szereg  $1, 2, 3, \dots, m$  inaczej uporządkowany), otrzymujemy inną wartość funkcyi:

$$v_1 = f(x_\alpha, x_\beta, \dots, x_\nu),$$

a o tem cośmy wykonali, mówi się, że w danej funkcyi dokonaniem zostało *podstawienie* wyrażone przez symbol:

$$(1) \quad \begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, \dots, x_m \\ x_\alpha, x_\beta, x_\gamma, \dots, x_\nu \end{pmatrix}$$

Porównywając ten symbol z wartościami  $v_1$  i  $v$ , widzimy, że  $v_1$  od  $v$  różni się podstawieniem  $x_\alpha$  za  $x_1$ ,  $x_\beta$  za  $x_2$ ,  $x_\gamma$  za  $x_3, \dots, x_\nu$  za  $x_m$ , w funkcyi  $v$  dokonaniem, co symbol (1) doskonale przedstawia. Jeżeli symbol (1) ma tylko oznaczać dopiero co wymienione działanie, co zakładamy, podstawienie dowolne kolumn go składających znaczenia jego nie zmieni. Tak więc, każdy symbol podstawienia, lub krócej, każde podstawienie

$$(2) \quad \begin{pmatrix} x_{\alpha_1}, x_{\beta_1}, \dots, x_{\nu_1} \\ x_{\alpha_2}, x_{\beta_2}, \dots, x_{\nu_2} \end{pmatrix},$$

przez przestawienie jego kolumn do kształtu (1) sprowadzić można, nie naruszając przez to jego pierwotnego znaczenia.

4. Weźmy pod uwagę podstawienie (2) złożone z  $m$  kolumn. Jeżeli każde  $l$  kolumn ( $l < m$ ) przedstawiają w szeregu górnym inną kombinacyę jak w szeregu dolnym, i jeżeli cały szereg górny stanowi tę samą kombinacyę co szereg dolny, podstawienie takie nazywa się *kołowym*. Podstawieniu kołowemu można nadać postać:

$$\begin{pmatrix} x_2, x_3, x_4, \dots, x_m \\ x_3, x_4, x_5, \dots, x_m, x_1 \end{pmatrix}.$$

Wiadomo jest, że każde podstawienie daje się rozdzielić na podstawienia *kołowe cząstkowe*.

Gdy  $\alpha$  jest pierwiastkiem urojonym równania  $x^m - 1 = 0$ , szereg wszystkich pierwiastków wyrazi się przez:

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^m.$$

Kładąc zatem,

$$x_1 = \alpha, x_2 = \alpha^2, x_3 = \alpha^3, \dots, x_m = \alpha^m$$

wypada  $x_{m+\mu} = x_\mu$ .

Dodajmy do znaczków każdej z ilości  $x_1, x_2, \dots, x_m$ , liczbę całkowitą dodatnią  $\mu < m$ , otrzymamy

$$x_{1+\mu}, x_{2+\mu}, \dots, x_{m+\mu} = x_{1+\mu} = x_1, x_{2+\mu}, \dots, x_m, x_1, x_2, \dots, x_\mu,$$

na zasadzie powyższej uwagi. Nowy ten szereg podpiszmy pod pierwszym tak, aby każde dwie ilości  $x_\alpha$  i  $x_{\alpha+\mu}$  stanowiły jedną kolumnę pionową. W ten sposób znajdziemy następujące podstawienie

$$(1) \quad \begin{pmatrix} x_1, x_2, \dots, x_m \\ x_{1+\mu}, x_{2+\mu}, \dots, x_{m+\mu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1, x_2, \dots, x_m \\ x_{1+\mu}, x_{2+\mu}, \dots, x_\mu \end{pmatrix}.$$

Można dowieść, że wiele razy  $\mu$  jest liczbą pierwszą względem  $m$ , tyle razy podstawienie (1)

jest kołowym. Ztąd zaś wypada, że gdy  $m$  jest liczbą pierwszą, podstawienie (1) jest zawsze kołowym dla  $\mu < m$ , i to samo ma miejsce dla  $m$  jakiegokolwiek, gdy  $\mu = 1$ . Jeżeli  $m$  jest wielokrotnością liczby  $\mu$ , podstawienie (1) rozdzieli się na  $\mu$  podstawień kołowych cząstkowych, z których każde jest złożonem z  $\frac{m}{\mu}$  kolumn (\*).

Podstawienie (1) będziemy zawsze oznaczali przez  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu+1} \end{pmatrix}$  zaś znak  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_\mu \end{pmatrix}$  wyobrażać będzie podstawienie jakiegokolwiek.

**5. TWIERDZENIE I.** Gdy mamy daną przemianę  $P_1$  z  $m$  ilości danych i podstawienie  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$ , za jego pomocą otrzymamy z przemiany  $P_1$  przemianę  $P_2$ ; stosując do téj ostatniej to samo podstawienie, otrzymamy przemianę  $P_3$ , i tak dalej działając dojdziemy do takiej przemiany  $P_l$  że następująca będzie już przemianą  $P_1$ . Otóż, przemiany

$$P_1, P_2, P_3, \dots, P_l$$

w opisany sposób otrzymane, mają tę własność, że którebądź z podstawień

$$(1) \quad \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} P_1 \\ P_3 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} P_1 \\ P_l \end{pmatrix}$$

do nich zastosowane, doprowadzi zawsze do tego samego szeregu przemian, inaczej tylko uporządkowanego.

Uważmy najprzód, że wypisane przemiany w liczbie  $l$  są wszystkie między sobą różne, i te tylko które za pomocą podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$ , w opisany w twierdzeniu sposób, otrzymać można. Z tego powodu przemiana  $P_l$  za pomocą podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$ , dać może tylko jedną z poprzedzających ją  $P_a$  ( $a < l$ ), która także powstała za pomocą tego samego podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$  z przemiany  $P_{a-1}$ . A że z dwóch różnych przemian  $P_l$  i  $P_{a-1}$ , przy użyciu tego samego podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$ , dwóch jednakowych przemian  $P_a$  otrzymać nie można, przemianą zatem  $P_a$  musi być koniecznie przemiana  $P_1$ , i pierwsza część naszego twierdzenia jest dowiedziona.

Ponieważ, na podstawie w téj chwili dowiedzionej prawdy, za pomocą podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$  z szeregu  $l$  wypisanych przemian, otrzymujemy szereg następujący :

$$P_2, P_3, \dots, P_l, P_1,$$

a każde z podstawień (1), jest równoważne kilka razy zastosowanemu podstawieniu  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$  do pierwotnego szeregu przemian, widocznem jest, że każde z podstawień (1) może tylko zmienić porządek przemian pierwotnie wypisanych, c. b. d. d.

Wypisany w twierdzeniu szereg przemian, nazwiemy *przemianami nierozdzielniemi względem podstawienia danego*  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$ ; podstawienia zaś (1) będziemy nazywali *podstawieniami przez te przemiany wy-*

(\*) Wyżej przytoczone określenie podstawienia kołowego, i użycie pierwiastków równania dwumianowego ( $x^m - 1 = 0$ ) w dowodzeniu zamieszczonego tu twierdzenia Cauchy'ego, podane zostały po raz pierwszy przez profesora Babczyńskiego, przy wykładzie Algebry Wyższej w Szkole Głównej Warszawskiej w 1864 r. Nadawszy takie same znaczenia ilościom zmiennym wchodzącym w skład jakiegokolwiek funkcji, udało mi się dowieść kilka twierdzeń odnoszących się do liczby różnych jej wartości, jeszcze w roku 1866, które stanowią przedmiot niniejszej rozprawy.

znaczonemi.

6. TWIERDZENIE II. Liczba  $l$  przemian nierozdzielnych względem podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu+1} \end{pmatrix}$ , wynosi się

$$l = \frac{m}{\rho},$$

gdzie  $\rho$  jest największym wspólnym dzielnikiem liczb  $m$  i  $\mu$ ,

Ponieważ podstawieniem daném  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu+1} \end{pmatrix}$  jest następujące :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, \dots, x_m \\ x_{1+\mu}, x_{2+\mu}, \dots, x_{m+\mu} \end{pmatrix},$$

każda z przemian względem niego nierozdzielnych, otrzyma się z wzoru

$$(1) \quad x_{1+\omega\mu}, x_{2+\omega\mu}, x_{3+\omega\mu}, \dots, x_{m+\omega\mu}$$

zastępując w nim  $\omega$ , przez liczby:  $0, 1, 2, \dots, l-1$ .

Napisawszy w (1) za  $\omega$  liczbę  $l$ , przemiana tak otrzymana zamieni się na pierwszą podług poprzedzającego twierdzenia, a na zasadzie naszej ugody, mieć będziemy

$$l\mu - km = 0,$$

gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą nieoznaczoną. Wziąwszy ją i liczbę  $l$  za niewiadome tak napisanego równania, znajdujemy :

$$l = \frac{m}{\rho} t, \quad k = \frac{\mu}{\rho} t,$$

gdzie  $t$  jest liczbą całkowitą, a  $\rho$  największym wspólnym dzielnikiem liczb  $m$  i  $\mu$ .

Widoczne jest teraz, że najmniejsza wartość  $l$  różna od zera, i zadosyć czyniąca naszemu równaniu, to jest,  $l = \frac{m}{\rho}$ , jest liczbą przemian nierozdzielnych względem podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu+1} \end{pmatrix}$  c. b. d. o.

WNIOSEK. Gdy liczby  $m$  i  $\mu$  są pierwsze względem siebie, wtedy  $\rho=1$  a  $l=m$ . A zatem przemian z  $m$  ilości, nierozdzielnych względem podstawienia kołowego, jest  $m$ .

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$  i dane podstawienie  $\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \\ x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, x_2 \end{pmatrix}$ , przemiany nierozdzielne względem tego podstawienia są :

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6,$$

$$x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, x_2,$$

$$x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, x_4,$$

których liczba ze wzoru  $l = \frac{m}{\rho}$ , daje się oznaczyć, albowiem  $\mu=2$ ,  $m=6$ , więc  $\rho=2$ , a zatem

$$l = \frac{6}{2} = 3.$$

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ , i dane podstawienie kołowe

$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$ ; przemiany względem niego nierozdzielne są następujące :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, \\ & x_5, x_1, x_2, x_3, x_4, x_6, \\ & x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, \\ & x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, \\ & x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, \\ & x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, \end{aligned}$$

których jest  $l = m = 6$ .

**Twierdzenie III.** Jeżeli mamy podstawienie dające się rozdzielić na  $\alpha$  cząstkowych kształtu  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu_x+1} \end{pmatrix}$ , gdzie  $m_x$  oznacza liczbę kolumn cząstkowe podstawienia składających, a  $x$  którąś z liczb całkowitych między 1 i  $\alpha$  zawartych, tak, że  $m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_\alpha = m$ ; jeżeli  $\rho_x$  jest największym wspólnym dzielnikiem liczb  $m_x$  i  $\mu_x$ ;  $l$  przemian nierozdzielnych względem takiego podstawienia, wyraża się :

$$l = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot \dots \cdot m_\alpha}{\rho_1 \cdot \lambda_2 \cdot \rho_2 \cdot \lambda_3 \cdot \rho_3 \cdot \lambda_4 \cdot \dots \cdot \lambda_\alpha \cdot \rho_\alpha}$$

gdzie  $\lambda_x$  wyobraża największy wspólny dzielnik liczb :

$$\frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot \dots \cdot m_{x-1}}{\rho_1 \cdot \lambda_2 \cdot \rho_2 \cdot \lambda_3 \cdot \rho_3 \cdot \lambda_4 \cdot \lambda_x \cdot \rho_{x-1}} \quad \text{i} \quad \frac{m_x}{\rho_x}$$

dla każdego  $x$  pomiędzy 2 i  $\alpha$ .

Wyobraźmy sobie że wypisaliśmy wszystkie  $l$  przemian, o liczbę których nam chodzi. Z podstawienia danego odrzucimy jednocząstkowe, złożone z ostatnich  $m_\alpha$  kolumn. i względem podstawienia wyrażonego przez symbol pozostały, utwórzmy przemiany nierozdzielne z  $m - m_\alpha$  pozostałych ilości; liczbę ich oznaczmy przez  $F_{\alpha-1}$ .

Względem podstawienia odrzuconego, złożonego z  $m_\alpha$  kolumn, utwórzmy także przemiany nierozdzielne z odrzuconych  $m_\alpha$  ilości, i każdą z nich dopisujemy po kolei do każdej z  $F_{\alpha-1}$ , w ten sposób, że gdy się raz wyczerpną, zaczynamy powtórnie takie same działanie w dalszym ciągu.

Ponieważ przemian jednych, jest  $\frac{m_\alpha}{\rho_\alpha} = \varphi$ , mniej jak drugich  $F_{\alpha-1}$ , (zrobić tak zawsze można); po wydzieleniu liczby  $F_{\alpha-1}$  przez  $\varphi$ , na resztę otrzymamy  $r_\alpha$ , taką liczbę, że przemiana do ostatniej z  $F_{\alpha-1}$  dopisana, otrzyma się z pierwszej za pomocą następującego podstawienia :

$$\begin{pmatrix} x_{m-m_\alpha+1}, x_{m-m_\alpha+2}, \dots, x_m \\ x_{m-m_\alpha+r_\alpha \mu_\alpha+1}, x_{m-m_\alpha+r_\alpha \mu_\alpha+2}, \dots, x_{m+r_\alpha \mu_\alpha} \end{pmatrix}$$

Z drugiej strony wiemy, że liczba przemian nierozdzielnych względem tego podstawienia, jest równą  $\frac{m_\alpha}{p_\alpha}$ , jeżeli  $p_\alpha$  wyobraża największy wspólny dzielnik liczb  $m_\alpha$  i  $\mu_\alpha r_\alpha$ , a zatem liczba przemian  $l$ , wyrazi się :

$$(1) \quad l = F_{\alpha-1} \cdot \frac{m_\alpha}{p_\alpha}.$$

Oznaczając następnie przez  $\lambda_\alpha$ , największy wspólny dzielnik dla  $\varphi$  i  $r_\alpha$ , jest oczywiście  $p_\alpha = \lambda_\alpha \cdot \rho_\alpha$ ,

z kąd równanie (1) przekształca się na

$$(2) \quad l = F_{a-1} \cdot \frac{m_a}{\lambda_a \cdot \rho_a},$$

w którym, po uwzględnieniu równania  $F_{a-1} = Q\varphi + r_a$ , widzimy, że  $\lambda_a$  oznacza także największy wspólny dzielnik liczb  $F_{a-1}$  i  $\varphi$ .

Podobnym sposobem jak liczbę przemian  $l$  wyraziliśmy przez  $F_{a-1}$ , wyrazimy  $F_{a-1}$  przez  $F_{a-2}$ ,  $F_{a-2}$  przez  $F_{a-3}$  i t. d.; nareszcie, wyrazimy  $F_2$  przez  $F_1$  a  $F_1 = \frac{m_1}{\rho_1}$ . Wypisując pod sobą wartości na  $l$ ,  $F_{a-1}$ ,  $F_{a-2}$ , ...,  $F_2$ ,  $F_1$ , otrzymamy następujące równania:

$$\begin{aligned} l &= F_{a-1} \cdot \frac{m_a}{\lambda_a \cdot \rho_a}, \\ F_{a-1} &= F_{a-2} \cdot \frac{m_{a-2}}{\lambda_{a-1} \cdot \rho_{a-1}}, \\ F_{a-2} &= F_{a-3} \cdot \frac{m_{a-2}}{\lambda_{a-2} \cdot \rho_{a-2}}, \\ &\dots \dots \dots \\ F_2 &= F_1 \cdot \frac{\lambda_2 \cdot \rho_2}{m_2}, \\ F_1 &= \frac{m_1}{\rho_1}, \end{aligned}$$

a z nich

$$(3) \quad l = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \dots m_a}{\rho_1 \cdot \lambda_2 \cdot \rho_2 \cdot \lambda_3 \cdot \rho_3 \cdot \lambda_4 \dots \lambda_a \cdot \rho_a}.$$

WNIOSEK. Gdy w szczególności  $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_a$  są odpowiednio względem  $m_1, m_2, m_3, \dots, m_a$  liczbami pierwszymi, każda z liczb  $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \dots, \rho_a$  jest wtedy jednością, a wzór otrzymany przechodzi na następujący:

$$l = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \dots m_a}{\lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 \dots \lambda_a}$$

w którym  $\lambda_x$  jest największym wspólnym dzielnikiem liczb:

$$\frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \dots m_{x-1}}{\lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 \dots \lambda_{x-1}} \quad \text{i} \quad m_x$$

przy wszelkich wartościach  $x$  od 2 do  $a$ .

UWAGA. We wzorze (3), oznaczmy liczbę  $\frac{m_1 \cdot m_2 \dots m_n}{\rho_1 \cdot \lambda_2 \cdot \rho_2 \cdot \lambda_3 \dots \lambda_n \cdot \rho_n}$  przez  $p_n$ , i weźmy jeszcze liczbę:

$$\frac{m_{n+1} \cdot m_{n+2} \dots m_{n'}}{\lambda_{n+1} \cdot \rho_{n+1} \cdot \lambda_{n+2} \cdot \rho_{n+2} \dots \lambda_{n'} \cdot \rho_{n'}}$$

w której  $\lambda_{n+1}$  jest największym wspólnym dzielnikiem liczb  $p_n$  i  $\frac{m_{n+1}}{\rho_{n+1}}$ . Oznaczając przez  $\tau_{n+2}$  naj-

wiekszy wspólny dzielnik liczb:  $\frac{p_n}{\lambda_{n+1}}$  i  $\frac{m_{n+2}}{\rho_{n+2}}$ , a przez  $\varsigma_{n+2}$  największy wspólny dzielnik liczb:

$\frac{m_{n+1}}{\rho_{n+1}}$  i  $\frac{m_{n+2}}{\rho_{n+2}}$ , będzie  $\lambda_{n+2} = \tau_{n+2} \cdot \varsigma_{n+2}$ . Oznaczając następnie, największy wspólny dzielnik liczb:

$\frac{p_n}{\lambda_{n+1} \tau_{n+2}}$  i  $\frac{m_{n+3}}{\rho_{n+3}}$  przez  $\tau_{n+3}$ , a liczb:  $\frac{m_{n+1} \cdot m_{n+2}}{\rho_{n+1} \cdot \sigma_{n+2} \cdot \rho_{n+2}}$  i  $\frac{m_{n+3}}{\rho_{n+3}}$  przez  $\tau_{n+3}$ , będzie  $\lambda_{n+3} = \tau_{n+3} \cdot \sigma_{n+3}$ , i tak dalej postępując znajdziemy także  $\lambda_{n'} = \tau_{n'} \cdot \sigma_{n'}$ .

Z równania tego wypada :

$$\frac{m_{n+1} \cdot m_{n+2} \cdot \dots \cdot m_{n'}}{\lambda_{n+1} \cdot \rho_{n+1} \cdot \lambda_{n+2} \cdot \rho_{n+2} \cdot \dots \cdot \lambda_{n'} \cdot \rho_{n'}} = \frac{1}{\lambda_{n+1} \cdot \tau_{n+2} \cdot \tau_{n+3} \cdot \dots \cdot \tau_{n'}} \cdot \frac{m_{n+1} \cdot m_{n+2} \cdot \dots \cdot m_{n'}}{\rho_{n+1} \cdot \sigma_{n+2} \cdot \sigma_{n+3} \cdot \dots \cdot \sigma_{n'} \cdot \rho_{n'}}.$$

Położymy za czynnik pierwszy drugiej strony tego równania  $\frac{1}{q_{n'}}$ , a za czynnik drugi  $p_{n'}$ , będzie:

$$(i) \quad \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot \dots \cdot m_{n'}}{\rho_1 \cdot \lambda_2 \cdot \rho_2 \cdot \lambda_3 \cdot \rho_3 \cdot \lambda_4 \cdot \dots \cdot \lambda_{n'} \cdot \rho_{n'}} = \frac{p_n \cdot p_{n'}}{q_{n'}},$$

gdzie  $p_n$  wyobraża liczbę przemian nierozdzielnych względem podstawienia złożonego z  $n$  podstawień cząstkowych;  $p_{n'}$  liczbę przemian nierozdzielnych względem podstawienia złożonego z  $n' - n$  podstawień cząstkowych; zaś  $q_{n'}$  jest największym wspólnym dzielnikiem liczb  $p_n$  i  $p_{n'}$ .

Rozciągając podobne rozumowanie dalej, przyjdziemy do równania

$$l = \frac{p_n \cdot p_{n'} \cdot p_{n''} \cdot \dots \cdot p_n^{(\alpha-1)}}{q_{n'} \cdot q_{n''} \cdot q_{n'''} \cdot \dots \cdot q_n^{(\alpha-1)}},$$

któro znaczy co następuje: jeżeli dane podstawienie rozdzielić można na  $\alpha$  cząstkowych jakiegokolwiek, i jeżeli  $p_n, p_{n'}, p_{n''}, \dots, p_n^{(\alpha-1)}$ , są liczbami przemian nierozdzielnych względem podniesionych podstawień, *najmniejsza wspólna wielokrotna* liczb  $p_n, p_{n'}, p_{n''}, \dots, p_n^{(\alpha-1)}$ , jest liczbą przemian nierozdzielnych względem podstawienia danego.

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15},$$

i dane podstawienie

$$\left( \begin{matrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15} \\ x_7, x_8, x_9, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{10}, x_{11} \end{matrix} \right),$$

oznaczyć liczbę przemian nierozdzielnych względem tego podstawienia. Mamy w tym przypadku  $m=15$ ,  $m_1=9$ ,  $m_2=6$ ,  $\mu_1=6$ ,  $\mu_2=2$ ,  $\rho_1=3$ ,  $\rho_2=2$ ,  $\lambda_2=3$ . Zatem liczba przemian jest

$$l = \frac{m_1 \cdot m_2}{\rho_1 \cdot \lambda_2 \cdot \rho_2} = \frac{9 \cdot 6}{3 \cdot 3 \cdot 2} = 3; \text{ przemianami zaś są:}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15},$$

$$x_7, x_8, x_9, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{10}, x_{11},$$

$$x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_1, x_2, x_3, x_{14}, x_{15}, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13},$$

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10},$$

i dane podstawienie :

$$\left( \begin{matrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \\ x_8, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_8, x_{10}, x_7 \end{matrix} \right),$$

oznaczyć liczbę przemian nierozdzielnych względem tego podstawienia. Mamy w tym razie  $m=10$ ,

$$m_1=6, m_2=4, \mu_1=5, \mu_2=1, \rho_1=1, \rho_2=1, \lambda_2=2. \text{ Liczba przemian jest: } l = \frac{m_1 \cdot m_2}{\lambda_2} = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12;$$

zaś przemianami są :

$$\begin{aligned}
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, \\
 & x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_8, x_9, x_{10}, x_7, \\
 & x_3, x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, x_9, x_{10}, x_7, x_8, \\
 & x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, x_{10}, x_7, x_8, x_9, \\
 & x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, x_7, x_8, x_9, x_{10}, \\
 & x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, x_8, x_9, x_{10}, x_7, \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_9, x_{10}, x_7, x_8, \\
 & x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_{10}, x_7, x_8, x_9, \\
 & x_3, x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, x_7, x_8, x_9, x_{10}, \\
 & x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, x_9, x_{10}, x_7, \\
 & x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, x_{10}, x_7, x_8, \\
 & x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, x_{10}, x_7, x_8, x_9.
 \end{aligned}$$

7. Niech symbol  $\left( \begin{smallmatrix} P \\ P_{\mu+1} \end{smallmatrix} \right)$  wyobraża podstawienie kołowe, a zatem, dające się napisać pod postacią

$$(1) \quad \left( \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & x_3 & \dots x_m \\ x_{\mu+1} & x_{\mu+2} & x_{\mu+3} & \dots x_{\mu+m} \end{array} \right)$$

Jeżeli z symbolu tego wyjmiemy ilość  $x_a$ , a obok niej napiszemy tę, która się pod nią znajduje, to jest:  $x_{a+\mu}$ , dalej tę, która się pod  $x_{a+\mu}$  znajduje, to jest:  $x_{a+2\mu}$ ; to postępując w podobny sposób dalej, dojdziemy zawsze do takiej ilości  $x_{a+\omega\mu}$ , w której  $\omega=m$ . Gdyby bowiem tak się nie stało, przyszlibyśmy do innej ilości  $x_{a+\omega\mu}$  dla której  $\omega < m$ , i w tym przypadku w symbolu (1),  $\omega < m$  kolumna, stanowiłyby w wierszach górnym i dolnym tę samą kombinację. Symbol więc (1) nie przedstawiałyby podstawienia kołowego z  $m$  ilości, co jest przeciwnym założeniu. A zatem, dojdziemy zawsze do takiej ilości  $x_{a+\omega\mu}$ , w której  $\omega=m$ . Ale, gdy  $\omega=m$ ,  $x_{a+\omega\mu} = x_a$ , więc prowadząc dalej podobne działanie od tego miejsca, doszlibyśmy powtórnie do tego samego wypadku. Kończymy przeto kładąc  $\omega=m-1$ , i tym sposobem otrzymujemy przemianę :

$$(1) \quad x_a, x_{a+\mu}, x_{a+2\mu}, x_{a+3\mu}, \dots x_{a+(m-1)\mu}$$

którą będziemy nazywali *przemianą odpowiednią podstawieniu* (1). Pisząc we wzorze (1) za  $\mu$  wszystkie liczby pierwsze względem  $m$  i mniejsze od  $m$ , otrzymamy  $\nu$  przemian, jeżeli  $\nu$  jest liczbą liczb pierwszych mniejszych od  $m$ .

PRZYKŁAD. Dana przemiana, pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7.$$

Wszystkie liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 są pierwsze względem 7, a więc sześć przemian odpowiednich sześciu podstawieniom kołowym, za pomocą wzoru (1) otrzymamy. Przemianami temi są :

$$\begin{aligned}
 & x_1, x_{1+1}, x_{1+2}, x_{1+3}, x_{1+4}, x_{1+5}, x_{1+6}, \\
 & x_1, x_{1+2}, x_{1+2 \cdot 2}, x_{1+3 \cdot 2}, x_{1+4 \cdot 2}, x_{1+5 \cdot 2}, x_{1+6 \cdot 2}, \\
 & x_1, x_{1+3}, x_{1+2 \cdot 3}, x_{1+3 \cdot 3}, x_{1+4 \cdot 3}, x_{1+5 \cdot 3}, x_{1+6 \cdot 3}, \\
 & x_1, x_{1+4}, x_{1+2 \cdot 4}, x_{1+3 \cdot 4}, x_{1+4 \cdot 4}, x_{1+5 \cdot 4}, x_{1+6 \cdot 4}, \\
 & x_1, x_{1+5}, x_{1+2 \cdot 5}, x_{1+3 \cdot 5}, x_{1+4 \cdot 5}, x_{1+5 \cdot 5}, x_{1+6 \cdot 5}, \\
 & x_1, x_{1+6}, x_{1+2 \cdot 6}, x_{1+3 \cdot 6}, x_{1+4 \cdot 6}, x_{1+5 \cdot 6}, x_{1+6 \cdot 6}.
 \end{aligned}$$

które po wykonaniu działań, przechodzą na następujące

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, \\ & x_1, x_3, x_5, x_7, x_2, x_4, x_6, \\ & x_1, x_4, x_8, x_3, x_6, x_2, x_5, \\ & x_1, x_5, x_2, x_6, x_3, x_7, x_4, \\ & x_1, x_6, x_4, x_2, x_7, x_5, x_3, \\ & x_1, x_8, x_6, x_5, x_4, x_3, x_2, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7; \end{aligned}$$

albowiem w miejsce każdego iloczynu  $\omega\mu$ , należy pisać resztę wypadłą z podzielenia jego przez ilość  $m$ . Reszty takie otrzymamy zawsze i wszystkie różne między sobą, bo  $\mu$  jest pierwsze względem  $m$ , a  $\omega < m$ .

8. a) Widzieliśmy [5. Tw. I), że przemiany *nierozdzielne względem podstawienia danego*, mają tę własność, że liczby ich i jakości żadne z *podstawień przez nie oznaczonych* nie zmienia. Gdy jednak przeciwnie, mamy przemiany posiadające tę ostatnią własność, nie można sądzić, ażeby one były nierozdzielne względem jednego tylko podstawienia. Owszem, wiele razy tak się zdarzy, wolno nam zawsze myśleć, że pomiędzy podstawieniami przez te przemiany oznaczonemi, znajdzie się pewna ich liczba od liczby wszystkich mniejsza, za pomocą których wszystkie te przemiany utworzyć będzie można. Podstawienia te, będą miały tę własność, że przemiany względem każdego z nich osobno nierozdzielne, mają tylko jedną przemianę (pierwotną) wspólną. W szczególnym tylko przypadku trafić się może jedno takie podstawienie. Przemiany o których teraz mówiliśmy nazwiemy *przemianami niezmienniającemi się od podstawień przez nie oznaczonych*.

b) Niech symbol  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_\mu \end{smallmatrix}\right)$  wyobraża podstawienie jakiegokolwiek z  $m$  ilości  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_m$ . Jeżeli do niego zastosujemy podstawienie wyrażone przez symbol  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_\alpha \end{smallmatrix}\right)$ , także jakiegokolwiek, otrzymamy nowy symbol  $\left(\begin{smallmatrix} P_\alpha \\ P_\rho \end{smallmatrix}\right)$ , który razem z symbolem  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_\mu \end{smallmatrix}\right)$  wyobraża tę myśl: że w jaki sposób przemiana  $P_\alpha$  powstała z przemiany  $P_1$ , w taki sam sposób powstała przemiana  $P_\rho$  z przemiany  $P_\mu$ . Z tego wypadu, że gdy nie zwrócimy żadnej uwagi na ilości  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_m$ , ale na miejsca przez te ilości zajęte, możemy powiedzieć, że w jaki sposób powstało  $P_\mu$  z  $P_1$ , w taki sam sposób powstało  $P_\rho$  z  $P_\alpha$ . Jeżeli zatem podstawienie  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_\mu \end{smallmatrix}\right)$  było względem ilości  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_m$  kołowym, podstawienie  $\left(\begin{smallmatrix} P_\alpha \\ P_\rho \end{smallmatrix}\right)$  względem ilości  $x_\alpha, x_\beta, x_\gamma, \dots, x_\nu$  ( $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \nu$  są liczby między sobą różne i stanowiące szereg 1, 2, 3,  $\dots, m$  inaczéj uporządkowany), będzie takim samym.

9. TWIERDZENIE IV. Jeżeli we wzorze

$$x_1, x_{1+\mu}, x_{1+2\mu}, \dots, x_{1+(m-1)\mu},$$

za  $\mu$  napiszemy wszystkie liczby pierwsze względem  $m$ ,  $\nu$  przemian tym sposobem utworzonych, są niezmienniającemi się od podstawień przez nie oznaczonych.

Niech symbole

$$(1) \quad \left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_1+1} \end{smallmatrix}\right), \quad \left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_2+1} \end{smallmatrix}\right), \quad \left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_3+1} \end{smallmatrix}\right), \quad \dots, \quad \left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_\nu+1} \end{smallmatrix}\right),$$



wyobrażają wszystkie podstawienia kołowe, jakie z  $m$  ilości być mogą, a

$$(2) \quad P_1, P_2, P_3, \dots, P_{v-1}, P_v,$$

niech będą przemianami tym podstawieniom odpowiadającymi. Którybądź z symbolów (1) można napisać w ten sposób:

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, \dots, x_m \\ x_1+\mu_p, x_2+\mu_p, x_3+\mu_p, \dots, x_m+\mu_p \end{pmatrix}$$

lub także,

$$\begin{pmatrix} x_1, x_{1+1}, x_{1+2}, \dots, x_{1+(m-1)} \\ x_1+\mu_p, x_{1+\mu_p+1}, x_{1+\mu_p+2}, \dots, x_{1+\mu_p+m-1} \end{pmatrix}$$

Stosując do tego ostatniego symbolu podstawienie

$$\begin{pmatrix} x_1, x_{1+1}, x_{1+2}, \dots, x_{1+(m-1)} \\ x_1, x_{1+\mu_a}, x_{1+\mu_a}, \dots, x_{1+(m-1)\mu_a} \end{pmatrix},$$

otrzymamy nowy symbol złożony z kolumn kształtu

$$\begin{pmatrix} x_1+\lambda\mu_a \\ x_1+(\mu_p+\lambda)\mu_a \end{pmatrix}$$

Ponieważ różnica znaczków u zmiennej  $x$  jest równą  $\mu_a\mu_p$ , liczbie pierwszej względem  $m$ , a zatem, podstawienie nasze po dokonaniu w nim pomienionego działania nie przestało być kołowym względem tych samych ilości. Symbole (1) wyobrażają podstawienia kołowe różne, i nowe symbole teraz otrzymane, muszą być także różnymi między sobą, ale temi samymi co tamte. Przemiany zatem (2) są niezmiennymi się od podstawień przez nie oznaczonych, *c. b. d. o.*

UWAGA. Gdy jest dana liczba  $m$ , i wszystkie liczby względem niej pierwsze, jedną z nich którąkolwiek niech wyobraża liczba  $\mu$ . Podnosząc tę liczbę  $\mu$  do potęg  $0, 1, 2, 3, \dots, v'$ , liczby w ten sposób otrzymane są także pierwszymi względem liczby  $m$ . Jeżeli w miejsce tych, weźmie się reszty wypadłe z dzielenia ich przez  $m$ , te będą także pierwszymi względem  $m$ , ale i mniejszymi od  $m$ . Ołóż, znajdzie się taka liczba  $v'$ , że reszta wypadła z podzielenia liczby  $\mu^{v'}$  przez  $m$ , będzie jednością, to jest,  $=\mu^0$ , i od tego miejsca wszystkie te liczby, które poprzednio wypadały i w tym samym porządku, powtarzać się będą. Takim zatem sposobem otrzymamy pewną grupę  $v'$  liczb pierwszych względem  $m$ . Gdy liczb wszystkich pierwszych względem  $m$  i mniejszych od  $m$  jest  $v$ , i gdy  $v=\nu'$ , wtedy liczba  $\mu$  nazywa się *pierwiastkiem pierwotnym* (racine primitive) liczby  $m$ .

Jeżeli na przykład liczbą  $m$  jest 7, liczb względem niej pierwszych i mniejszych jest 6. Poddając każdą z nich (1, 2, 3, 4, 5, 6,) wskazanemu wyżej działaniu, przekonać się łatwo można, że żadna nie jest pierwiastkiem pierwotnym  $7^{\text{ka}}$ . Przeciwnie się dzieje z  $6^{\text{ka}}$ , która posiada dwie tylko liczby (1, 5) względem niej pierwsze i mniejsze, i dla której jednocześnie  $5^{\text{ka}}$  jest pierwiastkiem pierwotnym.

TWIERDZENIE V. Jeżeli  $\mu$  jest liczbą pierwszą względem  $m$  i mniejszą od  $m$ , przemiany utworzone z wzoru:

$$(1) \quad x_1, x_{1+\mu}, x_{1+2\mu}, \dots, x_{1+(m-1)\mu},$$

przez zastąpienie  $\mu$  liczbami  $\mu^1, \mu^2, \mu^3, \dots, \mu^{v'}$ , są nierozdzielne względem podstawienia

$$(2) \quad \begin{pmatrix} x_1, x_{1+1}, x_{1+2}, \dots, x_{1+(m-1)} \\ x_1, x_{1+\mu}, x_{1+2\mu}, \dots, x_{1+(m-1)\mu} \end{pmatrix}.$$

Jakoż, utwórzmy za pomocą danego podstawienia pewną liczbę  $v'$  przemian. Przemianami temi są następujące :

$$\begin{array}{ccccccccccc}
\mathcal{X}_1, & \mathcal{X}_{1+1}, & \mathcal{X}_{1+2}, & \dots, & \mathcal{X}_{1+(m-1)}, \\
\mathcal{X}_1, & \mathcal{X}_{1+\mu}, & \mathcal{X}_{1+2\mu}, & \dots, & \mathcal{X}_{1+(m-1)\mu}, \\
\mathcal{X}_1, & \mathcal{X}_{1+\mu^2}, & \mathcal{X}_{1+2\mu^2}, & \dots, & \mathcal{X}_{1+(m-1)\mu^2}, \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
\mathcal{X}_1, & \mathcal{X}_{1+\mu^{v'}}, & \mathcal{Y}_{1+2\mu^{v'}}, & \dots, & \mathcal{X}_{1+(m-1)\mu^{v'}}.
\end{array}$$

Jeżeli  $\nu'$  jest liczbą taką, że  $\mu'$  po wydzieleniu przez  $m$  daje na resztę jedność, co zakładamy, przemiany (3) są nierozdzielniemi względem podstawienia (2). Ale przemiany z wzoru (1) otrzymane sposobem w twierdzeniu opowiedzianém, są temi samemi co przemiany (3), więc twierdzenie jest dowiedzioném.

WNIOSEK. Gdy  $v=v$ , wypada: jeżeli  $\mu$  jest pierwiastkiem pierwotnym liczby  $m$ ,  $v$  przemian utworzone sposobem opisanym w [7], są nierozdzielne względem podstawienia (2).

**Twierdzenie VI.** Jeżeli  $\mu$  jest taką liczbą pierwszą względem  $m$ , że za pomocą niej, w sposób powyżej opisany, otrzymamy  $\nu'$  liczb pierwszych względem  $m$ ; jeżeli nadto  $\lambda$  jest liczbą także pierwszą względem  $m$ , ale różną od każdej z tam otrzymanych, podstawienia :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, \dots, x_m \\ x_1, x_{1+\lambda}, x_{1+2\lambda}, \dots, x_{1+(m-1)\lambda} \end{pmatrix} \text{ и } \begin{pmatrix} x_1, x_{1+\mu^\alpha}, x_{1+2\mu^\alpha}, \dots, x_{1+(m-1)\mu^\alpha} \\ x_1, x_{1+\lambda\mu^\alpha}, x_{1+2\lambda\mu^\alpha}, \dots, x_{1+(m-1)\lambda\mu^\alpha} \end{pmatrix}$$

są równoważne ( $\alpha$  jest liczbą całkowitą zawartą między 1 i  $v' - 1$ ).

Jakoż, ponieważ pierwsze z danych podstawień, można wyrazić przez symbol następujący :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_{1+1}, x_{1+2}, \dots, x_{1+m-1} \\ x_1, x_{1+\lambda}, x_{1+2\lambda}, \dots, x_{1+(m-1)\lambda} \end{pmatrix},$$

a szereg reszt otrzymany z dzielenia liczb pierwszych  $\mu^a, 2\mu^a, 3\mu^a, \dots, (m-1)\mu^a$  przez  $m$ , daje wszystkie liczby w szeregu  $1, 2, 3, \dots, m-1$  zawarte, widocznym jest, że oba wypisane podstawienia są równoważne.

UWAGA. Jeżeli  $\mu = \mu_1$ , i jeżeli  $\lambda = \mu_2$ , jest taką liczbą pierwszą względem  $m$ , że utworzywszy z niej  $v''$  liczb pierwszych i mniejszych względem  $m$ , te będą różnymi od  $v'$  liczb, w podobny sposób z  $\mu_1$  otrzymanych; przemiany nierozdzielne względem podstawienia

$$(1) \quad \begin{pmatrix} x_1, & x_{1+1}, & x_{1+2}, & \dots, & x_{1+(m-1)} \\ x_1, & x_{1+\mu_1}, & x_{1+2\mu_1}, & \dots, & x_{1+(m-1)\mu_1} \end{pmatrix},$$

i przemiany nierozdzielne względem podstawienia

$$(2) \quad \begin{pmatrix} x_1, x_{1+1}, x_{1+2}, \dots, x_{1+m-1} \\ x_1, x_{1+\lambda_0}, x_{1+2\lambda_0}, \dots, x_{1+(m-1)\lambda_0} \end{pmatrix},$$

będą miały tylko jedną przemianę (pierwotną) wspólną. Utworzywszy zatem z każdej z przemian nierozdzielnych względem podstawienia (1) przemiany nierozdzielne względem podstawienia (2), otrzymamy prostokąt przemian niezmienniczych się od podstawień przez nie oznaczonych, na mocy twierdzenia VI, a liczba ich oznaczy się przez  $v''$ . Dobierając liczbę  $\mu_3$  taką, aby się względem  $\mu_1$  i  $\mu_2$  jednocześnie podobnie zachowywała jak to było z  $\mu_2$  względem  $\mu_1$ , i oznaczając przez  $v'''$  liczbę prze-

mian jój odpowiadających; po utworzeniu z każdej z  $v'v''$  przemian  $v'''$ , przemian nierozdzielnych względem nowego podstawienia, otrzymamy  $v'v''v'''$  przemian, niezmiennających się od podstawień przez nie oznaczonych. Postępując w podobny sposób dalej, widocznem jest, że jeżeli liczby  $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_n$  są względem siebie i względem  $m$  takimi, jakimi były liczby  $\mu_1, \mu_2, \mu_3$ , poprzednio uważane, i jeżeli  $v', v'', v''', \dots, v^{(n)}$  są liczbami przemian nierozdzielnych odpowiadających liczbom  $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_n$ ; to utworzywszy podobnie jak wyżej, przemiany niezmiennające się od podstawień przez nie oznaczonych, liczba ich wyrazi się przez iloczyn

$$l = v'v''v''' \dots v^{(n)}.$$

Jeżeli zaś liczby  $\mu$  są wszystkimi, jakie liczbie  $m$  odpowiadają, a  $v$  liczba wszystkich liczb pierwszych i mniejszych względem  $m$ , jest

$$l = v = v'v''v''' \dots v^{(n)}.$$

PRZYKŁAD. Niech przemianą daną będzie następująca:

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$$

W przypadku teraźniejszym mamy  $v=6$ , a biorąc  $\mu_1=2$  i  $\mu_2=6$ , znajdujemy  $\mu_1^0=1, \mu_1=2, \mu_1^2=4$ , zatem  $v'=3$ ; następnie  $\mu_1^0=1, \mu_2=6$ , zatem  $v''=2$ , jak być powinno, bo  $v=v'v''=3 \cdot 2=6$ .

Przemiany otrzymane ugrupują się jak następuje:

$$\begin{array}{lll} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 & x_1, x_3, x_5, x_7, x_2, x_4, x_6 & x_1, x_3, x_2, x_5, x_6, x_7, x_4 \\ x_1, x_7, x_5, x_6, x_4, x_3, x_2 & x_1, x_5, x_4, x_2, x_7, x_3, x_6 & x_1, x_4, x_7, x_3, x_5, x_6, x_2 \end{array}$$

Podług twierdzenia IV wypadło, że  $v$  przemian dopiero co uważanych, są niezmiennającymi się od podstawień przez nie oznaczonych, w uwadze zaś do twierdzenia VI należącej, okazaliśmy, że można te  $v$  przemian uporządkować w szereg podwójny, potrójny i t. d. innemi słowy, że można znaleźć takie podstawienia, za pomocą których przemiany te można utworzyć, i znaleźć ich wszystkich liczbę, znając liczby przemian nierozdzielnych względem każdego z tych podstawień. Podstawienie względem którego  $v'$  przemian są nierozdzielnymi, będziemy oznaczali przez symbol  $\begin{pmatrix} P_m \\ P_{m,v'} \end{pmatrix}$

**10.** Jeżeli z pomiędzy pewnej liczby przemian *niezmiennających się od podstawień przez nie oznaczonych* wybierzemy takie, które stanowią *przemiany nierozdzielne* względem pewnego oznaczonego podstawienia, każdej z nich odpowiada szereg *przemian niezmiennających się od podstawień przez nie oznaczonych*. Wybrawszy z takiego szeregu przemiany względem pewnego oznaczonego podstawienia *nierozdzielac*, każdej z nich znowu odpowiadać będzie szereg przemian podobnych jak wyżej, z którym więc tak samo postąpić będziemy mogli. Działając w taki sposób do końca, znajdziemy podstawienia

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\lambda_1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\lambda_2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\lambda_3} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\lambda_n} \end{pmatrix},$$

za pomocą których otrzymują się przemiany z jakich wyszliśmy. Oznaczając przeto przez  $l_x$  liczbę przemian nierozdzielnych względem podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\lambda_x} \end{pmatrix}$ , liczba przemian o których była mowa wyraża się

$$L = l_1 \cdot l_2 \cdot l_3 \dots l_n.$$

**Twierdzenie VII.** Liczba przemian nierozdzielnych względem podstawienia dającego się rozłożyć na  $\alpha$  cząstkowych, w ten sposób, że symbol jego napisać można pod postacią

$$\left[ \binom{P_{m_1}}{P_{m_1, v'_1}} \binom{P_{m_2}}{P_{m_2, v'_2}} \binom{P_{m_3}}{P_{m_3, v'_3}} \dots \binom{P_{m_\alpha}}{P_{m_\alpha, v'_\alpha}} \right]$$

wyraża się

$$L = \frac{v'_1 \cdot v'_2 \cdot v'_3 \dots v'_\alpha}{v'_2 \cdot v'_3 \cdot v'_4 \dots v'_\alpha},$$

gdzie  $v_x$  wyobraża największy wspólny dzielnik liczb

$$\frac{v'_1 \cdot v'_2 \cdot v'_3 \dots v'_{x-1}}{v'_2 \cdot v'_3 \cdot v'_4 \dots v'_{x-1}} \quad \text{ i } \quad v'_x,$$

dla każdego  $x$  pomiędzy 2 i  $\alpha$ .

Pomiędzy liczbami  $v'_x$  mogą się znaleźć liczby  $v$ , a wzór ten prawdziwym zawsze będzie.

**11. Twierdzenie VIII.** Jeżeli  $\mu_1$  i  $\mu_2$  są liczbami mniejszemi od  $m$ , a  $\rho_1$  i  $\rho_2$  największe wspólne dzielniki:  $\rho_1$  dla  $m$  i  $\mu_1$ , zaś  $\rho_2$  dla  $m$  i  $\mu_2$ ; przemiany nierozdzielne względem podstawienia  $\binom{P_1}{P_{\mu_1+1}}$  i przemiany nierozdzielne względem podstawienia  $\binom{P_1}{P_{\mu_2+1}}$ , mają:

1° przemian wspólnych  $T = \frac{m}{\theta}$ , gdy  $\rho_1$  i  $\rho_2$  są względem siebie niewielokrotne, a  $\theta$  jest największym wspólnym dzielnikiem liczb  $\rho_1 \rho_2$  i  $m$ .

2° przemian wspólnych  $T = \frac{m}{\rho_2}$ , gdy  $\rho_2$  jest wielokrotnością  $\rho_1$ .

Uważmy, że każdą przemianę z nierozdzielnych względem podstawienia  $\binom{P_1}{P_{\mu_1+1}}$  otrzymamy z wzoru

$$(a) \quad x_{\omega_1 \mu_1 + 1}, x_{\omega_1 \mu_1 + 2}, x_{\omega_1 \mu_1 + 3}, \dots, x_{\omega_1 \mu_1 + m}$$

kładąc za  $\omega_1$  po kolei, liczby: 0, 1, 2, ...  $\frac{m}{\rho_1} - 1$ .

Tak samo, każdą przemianę z nierozdzielnych względem podstawienia  $\binom{P_1}{P_{\mu_2+1}}$ , otrzymamy z wzoru

$$(b) \quad x_{\omega_2 \mu_2 + 1}, x_{\omega_2 \mu_2 + 2}, x_{\omega_2 \mu_2 + 3}, \dots, x_{\omega_2 \mu_2 + m}$$

kładąc z  $\omega_2$  po kolei, liczby: 0, 1, 2, ...  $\frac{m}{\rho_2} - 1$ .

Jeżeli pomiędzy przemianami (a) i (b) mają znaleźć się wspólne, powinno być  $x_{\omega_1 \mu_1 + \alpha} = x_{\omega_2 \mu_2 + \alpha}$ , a gdy ilości zmienne uważamy za pierwiastki równania  $x^m - 1 = 0$ , aby założony warunek miał miejsce, musi istnieć jednocześnie równanie

$$\omega_1 \mu_1 - \omega_2 \mu_2 = km,$$

w którym  $k$  jest liczbą całkowitą.

Położmy

$$\mu_1 = c_1 \rho_1 \quad \text{ i } \quad \mu_2 = c_2 \rho_2$$

równanie nasze zamieni się na

$$(\omega_1 c_1) \rho_1 - (\omega_2 c_2) \rho_2 = km,$$

które, gdy rozwiążemy względem  $\omega_1 c_1$  i  $\omega_2 c_2$ , będziemy mieli:

1° jeżeli  $\rho_1$  i  $\rho_2$  nie są względem siebie wielokrotne

$$(1) \quad \begin{aligned} \omega_1 c_1 &= k \frac{m}{\rho_1} + \rho_2 t \\ \omega_2 c_2 &= \rho_1 t \end{aligned}$$

2° jeżeli  $\rho_2 = p\rho_1$ ,

$$(2) \quad \begin{aligned} \omega_1 c_1 &= k \frac{m}{\rho_1} + pt \\ \omega_2 c_2 &= t, \end{aligned}$$

gdzie  $t$  jest liczbą całkowitą.

Z równań (1) otrzymamy:

$$(3) \quad \begin{aligned} \omega_1 \mu_1 &= km + \rho_1 \rho_2 t, \\ \omega_2 \mu_2 &= \rho_1 \rho_2 t, \end{aligned}$$

zaś z równań (2)

$$(4) \quad \begin{aligned} \omega_1 \mu_1 &= km + \rho_2 t, \\ \omega_2 \mu_2 &= \rho_2 t, \end{aligned}$$

Ponieważ liczba  $k$  jest całkowitą, z wzorów (3) i (4) czytamy, że przemiany wspólne otrzymujemy tylko przy takich wartościach całkowitych  $t$ , dla których iloczyn  $\rho_1 \rho_2 t$  lub  $\rho_2 t$  nie jest podzielny bez reszty przez  $m$ . Po takiej ostatniej wartości na  $t$ , nastąpi ta, przy której nasz iloczyn jest podzielny przez  $m$ . Jeżeli więc tą liczbą jest  $T$ , każda liczba  $T + t$  dla wszystkich wartości  $t$  od 0 do  $T - 1$ , daje iloczyn  $\rho_1 \rho_2 (T + t)$  lub  $\rho_2 (T + t)$ , który po wydzieleniu przez  $m$  pozostawia tę samą resztę co iloczyn  $\rho_1 \rho_2 t$  lub  $\rho_2 t$ . Liczba więc  $T$  wyobraża liczbę przemian wspólnych o jakich mowa w twierdzeniu.

Aby tę liczbę otrzymać potrzeba rozwiązać względem  $T$  równanie

$$\rho_1 \rho_2 T = \gamma m \quad \text{lub} \quad \rho_2 T = \gamma m$$

( $\gamma$  wyobraża liczbę całkowitą), z których po rozwiązaniu znajdziemy, pisząc wartości najmniejsze dodatnie i różne od zera

$$T = \frac{m}{0} \quad \text{lub} \quad T = \frac{m}{\rho_2}$$

co było do dowodzenia.

WNIOSEK I. Gdy  $\rho_1$  i  $\rho_2$  nie są względem siebie wielokrotnymi i gdy  $\rho_1 \rho_2 = \lambda \cdot m$  ( $\lambda$  liczba całkowita), wtedy  $0 = m$  i  $T = 1$ . A zatem w tym przypadku między przemianami (a) i (b) będzie tylko jedna przemiana (pierwotna) wspólna.

WNIOSEK II. Gdy  $\rho_2 = p\rho_1$  wtedy  $T = \frac{m}{\rho_2} = \frac{m}{p\rho_1}$ , a gdy jeszcze  $p = 1$ , będzie  $T = \frac{m}{\rho_1}$ , to jest, wszystkie przemiany będą wspólne. Ponieważ liczby  $c_1$  i  $c_2$  mogą być jakiegokolwiek byle tylko pierwsze względem  $\frac{m}{\rho_1}$ , a więc, gdy  $c_1$  i  $c_2$  są liczbami pierwszymi względem  $m$ , a  $\rho_1$  dzielnikiem  $m$ , prze-

miany nierozdzielne względem podstawienia  $\left(\frac{P_1}{P_{c_1\rho_1+1}}\right)$  i przemiany nierozdzielne względem podstawienia  $\left(\frac{P_1}{P_{c_2\rho_2+1}}\right)$  są temi samemi.

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}$$

i dane podstawienia, pierwsze :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15} \\ x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \end{pmatrix},$$

drugie :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15} \\ x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \end{pmatrix}.$$

Podług tego przypadku mamy  $m=15$ ,  $\mu_1=6$ ,  $\mu_2=10$ , więc  $\rho_1=3$ ,  $\rho_2=5$ ,  $\rho_1\rho_2=15$ ,  $\theta=15$ ; zatem przemian wspólnych będzie  $T=\frac{m}{\theta}=\frac{15}{15}=1$ .

Liczba przemian nierozdzielnych względem podstawienia pierwszego oznaczy się za pomocą wzoru  $l=\frac{m}{\rho_1}=\frac{15}{3}=5$ ; przemianami temi są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15} \\ & x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \\ & x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12} \\ & x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3 \\ & x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \end{aligned}$$

Liczba przemian nierozdzielnych względem drugiego podstawienia, oznaczy się za pomocą wzoru :  $l=\frac{m}{\rho_2}=\frac{15}{5}=3$ . Przemianami temi są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15} \\ & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \\ & x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \end{aligned}$$

Porównywając obie grupy przemian, widzimy, że tylko jedna jest wspólną, jak być powinno.

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}$$

i dane podstawienia, jedno :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12} \\ x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_1, x_2 \end{pmatrix}$$

drugie :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12} \\ x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_1, x_2, x_3 \end{pmatrix}.$$

Podług tych danych mamy:  $m=12$ ,  $\mu_1=2$ ,  $\mu_2=3$ , więc,  $\rho_1=2$ ,  $\rho_2=3$ ,  $\rho_1\rho_2=6$  i  $0=6$ , zatem będzie,  $T=\frac{m}{0}=\frac{12}{6}=2$ .

Liczba przemian nierozdzielnych względem podstawienia pierwszego, oznaczy się za pomocą wzoru  $l=\frac{m}{\rho_1}=\frac{12}{2}=6$ . Przemianami temi są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12} \\ & x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_1, x_2 \\ & x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_1, x_2, x_3, x_4 \\ & x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \\ & x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \\ & x_{11}, x_{12}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \end{aligned}$$

Liczba przemian nierozdzielnych względem podstawienia drugiego, oznaczy się za pomocą wzoru  $l=\frac{m}{\rho_2}=\frac{12}{3}=4$ . Przemianami temi są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12} \\ & x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_1, x_2, x_3 \\ & x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \\ & x_{11}, x_{12}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \end{aligned}$$

Porównywając obie grupy przemian, widzimy, że mają dwie przemiany wspólne, jak z rachunku wypadło.

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8,$$

i dane podstawienia, jedno :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \\ x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4 \end{pmatrix}$$

drugie :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \\ x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \end{pmatrix}.$$

Mamy obecnie  $m=8$ ,  $\mu_1=4$ ,  $\mu_2=6$ , więc  $\rho_1=4$ ,  $\rho_2=2$ , zatem  $\rho_1=2$ ,  $\rho_2=2$ ,  $T=\frac{m}{\rho_1}=\frac{8}{4}=2$ .

Liczba przemian nierozdzielnych względem podstawienia pierwszego, oznaczy się za pomocą wzoru  $l=\frac{m}{\rho_1}=\frac{8}{4}=2$ . Przemianami temi są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \\ & x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4 \end{aligned}$$

Liczba przemian nierozdzielnych względem podstawienia drugiego, oznaczy się za pomocą wzoru  $l=\frac{m}{\rho_2}=\frac{8}{2}=4$ . Przemianami temi są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_7, x_7, x_8 \\ & x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2 \\ & x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4 \\ & x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \end{aligned}$$

Porównywając obie grupy przemian widzimy, że mają dwie wspólne.

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$$

i dane podstawienia, jedno :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \\ x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \end{pmatrix}$$

drugie :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \\ x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4 \end{pmatrix}$$

Podług tych danych mamy :  $m=8$ ,  $\mu_1=3$ ,  $\mu_2=4$ , więc,  $\rho_1=1$ ,  $\rho_2=4$  a  $T=\frac{m}{\rho_2}=\frac{8}{4}=2$ .

Liczba przemian nierozdzielnych względem podstawienia pierwszego, wyrazi się,  $l=\frac{m}{\rho_1}=8$ . Przemianami temi są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \\ & x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \\ & x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2 \\ & x_8, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \\ & x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4 \\ & x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_1 \\ & x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \\ & x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3 \end{aligned}$$

Liczba przemian nierozdzielnych względem podstawienia drugiego, wyrazi się,  $l=\frac{m}{\rho_2}=\frac{8}{4}=2$ . Przemianami temi są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \\ & x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4 \end{aligned}$$

Porównywając obie grupy przemian widzimy, że mają dwie wspólne.

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna :

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}$$

i dane podstawienia, jedno :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15} \\ x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \end{pmatrix},$$

drugie :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15} \\ x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \end{pmatrix}.$$

W tym przypadku mamy  $m=15$ ,  $\mu_1=3$ ,  $\mu_2=10$ , więc,  $\rho_1=\rho_2=3$ , a  $T=\frac{m}{\rho_1}l=\frac{15}{3}=3$

Przemianami nierozdzielnymi względem podstawienia pierwszego są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15} \\ & x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \\ & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \end{aligned}$$



Przemianami nierozdzielniemi względem podstawienia drugiego są :

$$\begin{aligned} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, \\ & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, \\ & x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \end{aligned}$$

Widzimy, że przemiany obydwóch grup są wszystkie wspólne i nierozdzielne względem obydwóch danych podstawień.

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$$

i dane podstawienia, pierwsze :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \\ x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_1 \end{pmatrix},$$

drugie :

$$\begin{pmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \\ x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \end{pmatrix}.$$

W tym przypadku mamy,  $m=6$ ,  $\mu_1=1$ ,  $\mu_2=5$ ,  $\rho_1=\rho_2=1$ , zatem,  $T=\frac{m}{\rho_1}=\frac{m}{\rho_2}=6$ . Liczba przemian i w jednym i drugim razie, wyraża się przez  $l=m=6$ . Przemianami temi są :

$$\begin{array}{ll} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, \\ x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, & x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, \\ x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, & x_1, x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, \\ x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, & x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, \\ x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, & x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, \\ x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, & x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, \end{array}$$

Tu widzimy, że obie grupy zawierają te same przemiany nierozdzielne względem każdego podstawienia kołowego z sześciu ilości  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ .

**12.** Niech będą podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu_1+1} \end{pmatrix}$  i  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu_2+1} \end{pmatrix}$ . Ażeby jedno podstawienie do drugiego zastosować, potrzeba, podług przytoczonej wyżej zasady [8, b], z przemiany  $P_{\mu_1+1}$  utworzyć nową w ten sposób, jak przemiana  $P_{\mu_2+1}$  z przemiany  $P_1$  powstała, następnie, przemianę nowoutworzoną pod przemianą  $P_{\mu_2+1}$  podpisać. Ale przemiana  $P_{\mu_2+1}$  powstała z przemiany  $P_1$  przez dodanie liczby  $\mu_2$  do znaczku każdej ilości w niej zachodzącej, zatem i przemiana o którą nam chodzi z przemiany  $P_{\mu_1+1}$  w ten sam sposób powstaje. Symbolem więc nowo utworzonym jest oczywiście  $\begin{pmatrix} P_{\mu_2+1} \\ P_{\mu_1+\mu_2+1} \end{pmatrix}$ , który równoważy się z symbolem  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu_1+1} \end{pmatrix}$  jak to kształt jego pokazuje. Dla tej samej przyczyny symbol powstały z drugiego, przez zastosowanie do niego pierwszego podstawienia, jest  $\begin{pmatrix} P_{\mu_1+1} \\ P_{\mu_1+\mu_2+1} \end{pmatrix}$ , równoważny z symbolem  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu_2+1} \end{pmatrix}$ .

**Twierdzenie IX.** Jeżeli z każdą z przemian nierozdzielnych względem podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_{\mu_1+1} \end{pmatrix}$ , utwo-

rzemy przemiany nierozdzielne względem podstawienia  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_2+1} \end{smallmatrix}\right)$ , szereg podwójny przemian pozostanie tym samym, choćbyśmy do niego zastosowali podstawienie niezmienniające szeregu przemian nierozdzielnych względem podstawienia  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_1+1} \end{smallmatrix}\right)$ , lub podstawienie, niezmienniające szeregu przemian nierozdzielnych względem podstawienia  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_2+1} \end{smallmatrix}\right)$ .

Jakoż, jeżeli

$$P_1, P_{\mu_1+1}, P_{2\mu_1+1}, \dots, P_{(l_1-1)\mu_1+1}$$

wyobrażają przemiany nierozdzielne względem podstawienia  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_1+1} \end{smallmatrix}\right)$ , i jeżeli

$$P_1, P_{\mu_2+1}, P_{2\mu_2+1}, \dots, P_{(l_2-1)\mu_2+1}$$

wyobrażają przemiany nierozdzielne względem podstawienia  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_2+1} \end{smallmatrix}\right)$ , szereg podwójny przemian jest:

$$\begin{array}{ccccccccccc} P_1, & P_{\mu_1+1}, & P_{2\mu_1+1}, & \dots, & P_{(l_1-1)\mu_1+1} & & & & & & \\ P_{\mu_2+1}, & P_{\mu_1+\mu_2+1}, & P_{2\mu_1+\mu_2+1}, & \dots, & P_{(l_1-1)\mu_1+\mu_2+1} & & & & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\ P_{(l_2-1)\mu_2+1}, & P_{\mu_1+(l_2-1)\mu_2+1}, & P_{2\mu_1+(l_2-1)\mu_2+1}, & \dots, & P_{(l_1-1)\mu_1+(l_2-1)\mu_2+1} \end{array}$$

Z szeregu tego widzimy, że każdy wiersz poziomy wyobraża przemiany nierozdzielne względem podstawienia  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_1+1} \end{smallmatrix}\right)$ , a każdy wiersz pionowy wyobraża przemiany nierozdzielne względem podstawienia  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_2+1} \end{smallmatrix}\right)$ . Gdy zatem tak jest, twierdzenie jest oczywistém.

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6,$$

i dane podstawienia, jedno :

$$\left(\begin{smallmatrix} x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6 \\ x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_1, & x_2 \end{smallmatrix}\right),$$

drugie :

$$\left(\begin{smallmatrix} x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6 \\ x_4, & x_5, & x_6, & x_1, & x_2, & x_3 \end{smallmatrix}\right).$$

Podwójny szereg przemian będzie :

$$\begin{array}{ccccccc} x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_1, & x_5, & x_6, & x_1, & x_2, & x_3, \\ x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_1, & x_2, & x_6, & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, \\ x_5, & x_6, & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_1, \end{array}$$

UWAGA. Jeżeli przemian nierozdzielnych względem podstawienia  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_1+1} \end{smallmatrix}\right)$  jest  $\frac{m}{\rho_1}$ , a przemian nierozdzielnych względem podstawienia  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_2+1} \end{smallmatrix}\right)$  jest  $\frac{m}{\rho_2}$ , przemian o których w twierdzeniu była mowa jest  $\frac{m^2}{\rho_1 \rho_2}$ . Jeżeli przemiany te mają być między sobą różne, koniecznym jest i dostatecznym,

ażeby  $e_1$  i  $e_2$  nie były względem siebie wielokrotnemi, i aby było  $\frac{e_1 e_2}{m} = e_3$ , niezbie całkowitej [11, Wnios. 1, Twier. VIII]. Założywszy to wszystko, jest  $\frac{m^2}{e_1 e_2} = \frac{m}{e_3}$ , gdzie  $e_3$  dzieli bez reszty  $m$ . Zład pokazuje się, że istnieje zawsze liczba  $\mu_3 < m$  [11, Wnios. 2, Twier. VIII], zawierająca w sobie czynnik  $e_3$  będący dla niej i dla liczby  $m$  największym wspólnym dzielnikiem, mówię taka liczba, że przemiany o jakich mowa są nierozdzielniemi względem podstawienia  $\left( \begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_3+1} \end{smallmatrix} \right)$ . Gdyby było  $e_3 = 1$ , wtedy  $\frac{m^2}{e_1 e_2} = m$ , i przemiany nasze byłyby nierozdzielniemi względem każdego podstawienia kołowego.

13. TWIERDZENIE X. Gdy we wzorze

$$(1) \quad x_\alpha, x_{\alpha+1}, x_{\alpha+2}, \dots, x_{\alpha+m-1}$$

za  $\alpha$  napiszemy liczby:

$$1, \mu, \mu+1, 2\mu, \mu+1, \dots, \left( \frac{m}{\rho_1} - 1 \right) \mu, \mu+1,$$

( $\rho_1$  jest największym wspólnym dzielnikiem liczb  $\mu_1$  i  $m$ ,  $\mu$  liczba pierwsza względem  $m$ ); przemiany w ten sposób otrzymane są nierozdzielniemi względem podstawienia  $\left( \begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu \cdot \mu_1 + 1} \end{smallmatrix} \right)$ .

Jakoż, napisawszy w (1) za  $\alpha$  liczby:  $\omega \mu, \mu+1$  i  $(\omega+1)\mu, \mu+1$ , znajdziemy:

$$\left( \begin{array}{c} x_{\omega \mu \mu_1 + 1}, x_{(\omega \mu_1 + 1)\mu + 1}, x_{(\omega \mu_1 + 2)\mu + 1}, \dots, x_{(\omega \mu_1 + m - 1)\mu + 1}, \\ x_{(\omega + 1)\mu \mu_1 + 1}, x_{(\omega + 1)\mu_1 \mu + 1}, x_{(\omega + 1)\mu_1 + 2)\mu + 1}, \dots, x_{(\omega + 1)\mu_1 + m - 1)\mu + 1}, \end{array} \right)$$

Uważając obie te przemiany za symbol podstawienia, widzimy, że on jest równoważny z symbolem  $\left( \begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu \mu_1 + 1} \end{smallmatrix} \right)$ , a zatem przemiany w opisany w twierdzeniu sposób z (1) powstałe są nierozdzielniemi względem podstawienia  $\left( \begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu \mu_1 + 1} \end{smallmatrix} \right)$  jakiegokolwiek jest  $\mu$ , byle tylko pierwsze względem  $m$ . [11, Wn. 2, Twier. VIII]. Gdy w szczególności  $\mu = 1$ , podstawienie  $\left( \begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu_1 + 1} \end{smallmatrix} \right)$  jest kołowym.

PRZYKŁAD. Dana przemiana pierwotna

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$$

Liczbą  $\mu$  może być 3 albo 5. Weźmy jedną i drugą i przemiany im odpowiednie. Stosując wzór (1) znajdziemy trzy przemiany wraz z pierwotną następujące:

$$(2) \quad \begin{array}{c} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, \\ x_1, x_4, x_7, x_2, x_5, x_8, x_3, x_6, \\ x_1, x_6, x_3, x_8, x_5, x_2, x_7, x_4, \end{array}$$

Weźmy teraz  $\mu_1 = 2$ , zatem  $\mu \mu_1 = 6$  w jednym przypadku i  $\mu \mu_1 = 10$  w przypadku drugim. A że za  $\mu \mu_1$  bierze się właściwie reszta wypadła z podzielenia  $\mu \mu_1$  przez  $m$ , zatem w przypadku drugim  $\mu \mu_1 = 2$ . Z powodu że  $m = 8$ , liczba przemian nierozdzielnych względem obydwóch podstawień  $\left( \begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{6+1} \end{smallmatrix} \right)$  i  $\left( \begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{10+1} \end{smallmatrix} \right)$  jest jednakową i przemiany wspólne, bo  $T = \frac{m}{e_2} = \frac{m}{e_1} = \frac{8}{2} = 4$ . Tworząc zatem z każdą z przemian (2) przemiany nierozdzielne względem któregoś z podstawień  $\left( \begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{6+1} \end{smallmatrix} \right)$  lub  $\left( \begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{10+1} \end{smallmatrix} \right)$

otrzymamy zawsze to samo.

$$\begin{array}{lll} x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 & x_1, x_4, x_7, x_2, x_5, x_8, x_3, x_6 & x_1, x_3, x_8, x_6, x_5, x_2, x_7, x_4, \\ x_3, x_1, x_5, x_8, x_7, x_6, x_1, x_2 & x_3, x_6, x_1, x_4, x_7, x_8, x_5, x_8 & x_3, x_8, x_4, x_2, x_7, x_6, x_1, x_6, \\ x_5, x_6, x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_1 & x_5, x_8, x_3, x_6, x_1, x_4, x_7, x_2 & x_5, x_2, x_7, x_5, x_1, x_6, x_3, x_8, \\ x_7, x_8, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 & x_7, x_2, x_5, x_8, x_3, x_6, x_1, x_4 & x_7, x_4, x_1, x_6, x_3, x_8, x_5, x_2. \end{array}$$

**14.** Jeżeli dane jest jakie podstawienie, to jak wiadomo, symbol jego rozdzielić można na pewną liczbę symbolów cząstkowych wyrażających podstawienia kołowe. Może się jednak trafić, że podstawienie wyrażone przez pewną liczbę takich symbolów cząstkowych, da się jeszcze wyrazić przez symbol złożony z podstawień kształtu  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu+1} \end{smallmatrix}\right)$  gdzie  $\mu$  nie jest liczbą pierwszą względem liczby kolumn symbol ten składających. Podług tego co już wyżej powiedzieliśmy [6. Twier. III], liczba przemian nierozdzielnych względem takiego podstawienia oznacza się za pomocą wzoru

$$l = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \dots m_a}{\rho_1 \cdot \lambda_2 \cdot \rho_2 \cdot \lambda_3 \cdot \rho_3 \cdot \lambda_4 \dots \lambda_a \cdot \rho_a}.$$

Jeżeli dobierzemy takie liczby  $\mu'_1, \mu'_2, \mu'_3, \dots, \mu'_a$  ażeby :

- 1° były mniejszemi i niepierwszemi względem liczb  $m_1, m_2, m_3, \dots, m_a$
- 2° ażeby  $\rho'_1, \rho'_2, \rho'_3, \dots, \rho'_a$  i odpowiednio  $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \dots, \rho_a$  nie były względem siebie wielokrotnemi,
- 3° ażeby niektóre z iloczynów  $\rho_1 \rho'_1, \rho_2 \rho'_2, \rho_3 \rho'_3, \dots, \rho_a \rho'_a$  były podzielne odpowiednio przez

$$m_1, m_2, m_3, \dots, m_a;$$

to podług twierdzenia VIII [11] i jego wniosków, pomiędzy przemianami nierozdzielniemi względem podstawienia składającego się z podstawień cząstkowych kształtu  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu'+1} \end{smallmatrix}\right)$ , a przemianami nierozdzielniemi względem podstawienia poprzednio uważanego, znajdzie tylko jedna pierwotna przemiana wspólna. Ponieważ liczba tych nowych przemian jest :

$$l_1 = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \dots m_a}{\rho'_1 \cdot \lambda'_2 \cdot \rho'_2 \cdot \lambda'_3 \cdot \rho'_3 \cdot \lambda'_4 \dots \lambda'_a \cdot \rho'_a},$$

zatem liczba przemian niezmienniających się od uważanych dwóch podstawień, wyrazi się przez iloczyn

$$L = l \cdot l_1 = \frac{m_1^2 \cdot m_2^2 \cdot m_3^2 \dots m_a^2}{\rho_1 \rho'_1 \lambda_2 \lambda'_2 \rho_2 \rho'_2 \lambda_3 \lambda'_3 \dots \lambda_a \lambda'_a \rho_a \rho'_a},$$

Przemiany te, których teraz liczbę wyraziliśmy, są wszystkie między sobą różne, co z warunków użytych do ich utworzenia oczywiście wypada.

Biorąc pod uwagę ilorazy wypadłe z dzielenia liczb  $\rho_1 \rho'_1, \rho_2 \rho'_2, \dots, \rho_a \rho'_a$  odpowiednio przez  $m_1, m_2, m_3, \dots, m_a$ , możemy dobrać liczby  $\rho''_1, \rho''_2, \dots, \rho''_a$  względem wypadłych teraz niewielokrotności, zadosyć czyniące warunkom na początku tego ustępu wymienionym. Możemy zatem utworzyć odpowiednie podstawienie złożone z podstawień cząstkowych kształtu  $\left(\begin{smallmatrix} P_1 \\ P_{\mu''+1} \end{smallmatrix}\right)$ , aby liczba przemian względem niego nierozdzielnych oznaczała się przez wzór :

$$l_2 = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \dots m_a}{\rho''_1 \cdot \lambda''_2 \cdot \rho''_2 \cdot \lambda''_3 \cdot \rho''_3 \cdot \lambda''_4 \dots \lambda''_a \cdot \rho''_a}.$$

Zastosowawszy to podstawienie do każdej z przemian poprzednio uważanych otrzymamy

$$L = l_1 l_2 l_3 = \frac{m_1^3 \cdot m_2^3 \dots m_\alpha^3}{\rho_1 \cdot \rho'_1 \cdot \rho'' \lambda_2 \lambda'_2 \lambda''_2 \cdot \rho_2 \rho'_2 \rho''_2 \cdot \lambda_3 \lambda'_3 \lambda''_3 \dots \lambda_\alpha \lambda'_\alpha \lambda''_\alpha \rho_\alpha \rho'_\alpha \rho''_\alpha},$$

przemian różnych między sobą i niezmiennających się od trzech uważanych podstawień.

W ogólności zatem

$$L = l_1 \cdot l_2 \cdot l_3 \dots l_n$$

jest liczbą przemian niezmiennających się od  $n$  uważanych podstawień a różnych między sobą. Przemiany te są niezmiennającymi się od podstawień przez nie oznaczonych, co więcej, znajduje się zawsze takie podstawienie, względem którego są nierozdzielni [12. Uwaga Twier. IX]. Maximum wielkości liczby  $L$  jest

$$\frac{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \dots m_\alpha}{\lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 \dots \lambda_\alpha},$$

to jest liczba przemian nierozdzielnych względem podstawienia dającego się rozdzielić na  $\alpha$  cząstkowych kołowych, i w tym przypadku, przemiany te są nierozdzielni względem tego podstawienia.

15. Oprócz podstawień, jakie stosowaliśmy do przemian nierozdzielnych względem podstawienia uważanego w poprzednim ustępie [14], możemy jeszcze podług ustępu [10] i Twierdzenia X [13] zastosować inne.

Niech  $v'_1, v'_2, v'_3, \dots v'_\alpha$  będą liczbami liczb pierwszych względem  $m_1, m_2, m_3, \dots m_\alpha$ , odpowiadającymi liczbom pierwszym  $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots \mu_\alpha$ . Liczba przemian nierozdzielnych dla tych liczb wyrazi się, podług twierdzenia VII [10], jak następuje

$$L' = \frac{v'_1 \cdot v'_2 \cdot v'_3 \dots v'_\alpha}{r'_2 \cdot r'_3 \cdot r'_4 \dots r'_\alpha}.$$

Jeżeli teraz w ogólności, liczby  $v', v'', v''', \dots v^{(e)}$  oznaczają liczby takie, jak w uwadze do twier. VI [9], to na zasadzie tego samego twierdzenia i ustępu [10], można położyć

$$L = L' \cdot L'' \cdot L''' \dots L^{(e)} = \frac{v'_1 \cdot v'_2 \dots v'_\alpha}{r'_2 \cdot r'_3 \dots r'_\alpha} \cdot \frac{v''_1 \cdot v''_2 \dots v''_\alpha}{r''_2 \cdot r''_3 \dots r''_\alpha} \dots \frac{v_1^{(e)} \cdot v_2^{(e)} \dots v_\alpha^{(e)}}{r_2^{(e)} \cdot r_3^{(e)} \dots r_\alpha^{(e)}}.$$

Gdy jest  $\rho = n$ , będzie  $v'_x, v''_x, v'''_x, \dots v_x^{(e)} = v_x$ , liczbie wszystkich liczb pierwszych względem  $m_x$  i mniejszych od  $m_x$  dla  $x$  od 1 do  $\alpha$ .

Z każdej z przemian  $L$  otrzymamy  $l$  przemian, podług poprzedniego ustępu, i będziemy mieli na zasadzie twierdzenia X [12],

$$L = \frac{\rho_1 \lambda_2 \rho_2 \lambda_3 \dots \lambda_\alpha \rho_\alpha}{m_1 \cdot m_2 \dots m_\alpha} \cdot \frac{v'_1 \cdot v'_2 \dots v'_\alpha}{r'_2 \cdot r'_3 \dots r'_\alpha} \cdot \frac{v''_1 \cdot v''_2 \dots v''_\alpha}{r''_2 \cdot r''_3 \dots r''_\alpha} \dots$$

Gdyby każda z liczb  $m_1, m_2, m_3, \dots m_\alpha$  miała pierwiastek pierwotny, mogłoby być

$$L = \frac{m_2 \cdot m_3 \dots m_\alpha}{\rho_1 \lambda_2 \rho_2 \lambda_3 \dots \lambda_\alpha \rho_\alpha} \cdot \frac{v_1 \cdot v_2 \dots v_\alpha}{r_1 \cdot r_2 \dots r_\alpha}.$$

Jeżeli  $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \dots = \rho_\alpha = 1$  jest:

$$L = \frac{m_1 \cdot m_2 \dots m_\alpha}{\lambda_2 \cdot \lambda_3 \dots \lambda_\alpha} \cdot \frac{v_1 \cdot v_2 \dots v_\alpha}{r_2 \cdot r_3 \dots r_\alpha}.$$

Gdy każda z liczb  $m_1, m_2, \dots m_a$  jest liczbą pierwszą, wzór ostatni jest jeszcze możebnym.

**16.** Jeżeli każde z podstawień cząstkowych ustępu [14] wyobraża dowolne podstawienie, liczba przemian niezmiennających się względem takiego podstawienia, wyraża się jak następuje :

$$L = m_1! m_2! m_3! \dots m_a!$$

**17.** Zbierając ostatecznie wszystko o czém dotąd powiedzieliśmy, otrzymujemy następujące wzory, na liczbę przemian niezmiennających się od podstawień przez nie oznaczonych.

$$\begin{aligned} L &= \frac{m_1 \cdot m_2 \dots m_a}{\rho_1 \cdot \lambda_2 \cdot \rho_2 \lambda_3 \dots \lambda_a \cdot \rho_a} \\ L &= \frac{m_1 \cdot m_2 \dots m_a}{\lambda_2 \cdot \lambda_3 \dots s_a} \\ L &= \frac{v'_1 \cdot v'_2 \dots v'_a}{r'_2 \cdot r'_3 \dots r'_a} \cdot \frac{v''_1 \cdot v''_2 \dots v''_a}{r''_2 \cdot r''_3 \dots r''_a} \cdot \frac{v'''_1 \cdot v'''_2 \dots v'''_a}{r'''_2 \cdot r'''_3 \dots r'''_a} \dots \\ L &= \frac{v_1 \cdot v_2 \dots v_a}{r_2 \cdot r_3 \dots r'_a} \\ L &= \frac{m_1 \cdot m_2 \dots m_a}{\rho_1 \lambda_2 \rho_2 \lambda_3 \dots \rho_a \lambda_a} \cdot \frac{v'_1 \cdot v'_2 \dots v'_a}{r'_2 \cdot r'_3 \dots r'_a} \dots \\ L &= \frac{m_1 \cdot m_2 \dots m_a}{\rho_1 \lambda_2 \rho_2 \lambda_3 \dots \lambda_a \rho_a} \cdot \frac{v_1 \cdot v_2 \dots v_a}{r_2 \cdot r_3 \dots r'_a} \\ L &= \frac{m_1 \cdot m_2 \dots m_a}{\lambda_2 \cdot \lambda_3 \dots m_a} \cdot \frac{v_1 \cdot v_2 \dots v_a}{r_2 \cdot r_3 \dots r'_a} \\ L &= m_1! \cdot m_2! \cdot m_3! \dots m_a! \end{aligned}$$

**18.** Zgodziliśmy się [1], ażeby za równe wartości funkcyi uważać takie tylko, które przy wszelkich wartościach zmiennych w tę funkcyę wchodzących nie przestają być sobie równymi. I nawzajem, gdy mamy na myśli różne wartości funkcyi, te także takimi mają pozostać przy wszelkich wartościach ilości zmiennych.

**Twierdzenie XI.** Funkcyą  $m$  zmiennych niezależnych, niezmiennająca swojej wartości skutkiem dokonanego w niej podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_\lambda \end{pmatrix}$ , ma jedną tylko wartość dla wszystkich przemian nierozdzielnych względem tego podstawienia.

Niech  $v = f(x_1, x_2, x_3, \dots x_m)$ , będzie funkcyą  $m$  zmiennych niezależnych, o której zakładamy, że nie zmienia swojej wartości przez dokonanie w niej podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_\lambda \end{pmatrix}$ , czyli innemi słowy, zakładamy równanie,

$$f(P_1) = f(P_\lambda).$$

Równanie to ma się utrzymywać przy wszelkich wartościach ilości zmiennych; stosując zatem do tego równania to samo podstawienie, otrzymamy nowe :

$$f(P_\lambda) = f(P_{2\lambda}),$$

które dla tój samój przyczyny, posiada własność poprzedzającego. Otrzymamy przeto oprócz tych

dwóch, następujący szereg równań :

$$\begin{aligned} f(P_2) &= f(P_3) \\ f(P_3) &= f(P_4) \\ &\vdots \\ &\vdots \\ f(P_{(t-1)}) &= f(P_{(t-1)}). \end{aligned}$$

a z nich wypada oczywiście

$$f(P_1) = f(P_2) = f(P_3) = \dots = f(P_{(t-1)}).$$

A że przemiany

$$(1) \quad P_1, P_2, P_3, \dots, P_{(t-1)}$$

są względem podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$  nierozdzielni, twierdzenie jest dowiedzionem.

**WNIOSEK.** Ponieważ przemiany (1) są także niezmiennymi się od podstawień przez nie oznaczonych, jeżeli

$$f(P_1), f(P_2), f(P_3), \dots, f(P_{(t-1)})$$

są różnymi wartościami funkcyj  $v$ , iloczyn ich

$$F = f(P_1) \cdot f(P_2) \cdot f(P_3) \dots f(P_{(t-1)}).$$

lub summa :

$$\psi = f(P_1) + f(P_2) + f(P_3) + \dots + f(P_{(t-1)})$$

jest funkcją ilości  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_m$ , niezmienną się od żadnego z podstawień przez przemiany (1) wyznaczonych.

Ponieważ wszystkie przemiany z  $m$  ilości są niezmiennymi się od podstawień przez nie oznaczonych funkcyjne :

$$F = f(P_1) \cdot f(P_2) \dots f(P_m),$$

$$\psi = f(P_1) + f(P_2) + \dots + f(P_m).$$

zachowują tę samą wartość dla każdego z pomienionych podstawień. Funkcja taka  $F$  lub  $\psi$  nazywa się funkcją symetryczną względem  $m$  ilości zmiennych w nie wchodzących.

**Twierdzenie XII (Lagrange'a).** Liczba różnych wartości funkcyj  $m$  zmiennych niezależnych, jest dzielnikiem liczby  $m!$

Niech

$$v = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

będzie funkcją  $m$  zmiennych niezależnych, o której zakładamy, że ma mieć jak  $m!$  wartości różnych.

Jeżeli przez

$$V_1, V_2, V_3, \dots, V_{m!}$$

oznaczymy wszystkie jej wartości, to jest, równe i różne między sobą, wielomian

$$(1) \quad (V - V_1)(V - V_2)(V - V_3) \dots (V - V_{m!}) = \sum_{\lambda} A_{\lambda} V^{m! - \lambda}$$

$m!$  stopnia względem  $V$  ma te wartości za swoje pierwiastki. Współczynniki tego wielomianu są

funkeyami symetrycznymi ilości  $x_1, x_2, \dots, x_m$ . Współczynnik  $A_{m!}$  w szczególności, przedstawić można pod postacią:

$$A_{m!} = (-1)^{m!} V_a^a \cdot V_\beta^b \cdot V_\gamma^c \dots V_\nu^k$$

gdzie  $V_a, V_\beta, V_\gamma, \dots, V_\nu$  wszystkimi różnymi wartościami funkeyi  $V$ , a  $a + b + c + \dots + k = m!$

Stosując do wielomianu (1) jakiegokolwiek podstawienie z tych samych  $m$  ilości zmiennych, wartości jego współczynników pozostaną niezmiennymi i będziemy mieli w ogólności:

$$A_{m!} = (-1)^{m!} V_a^{a_1} \cdot V_\beta^{b_1} \cdot V_\gamma^{c_1} \dots V_\nu^{k_1};$$

albowiem podstawienie tu dokonane mogło tylko zmienić w  $A_{m!}$  porządek różnych czynników, lub co na jedno wychodzi porządek ich wykładników.

Podług więc tego powinno być

$$V_a^{a-a_1} \cdot V_\beta^{b-b_1} \cdot V_\gamma^{c-c_1} \dots V_\nu^{k-k_1} = 1$$

przy wszelkich wartościach ilości  $x_1, x_2, \dots, x_m$  lub z czego wypada, przy wszelkich wartościach  $V_a, V_\beta, V_\gamma, \dots, V_\nu$ . To zaś inaczej być nie może, jak tylko wtedy gdy

$$a = a_1, b = b_1, c = c_1, \dots, k = k_1,$$

a więc gdy wszystkie wykładniki  $a, b, c, \dots, k$  są między sobą równymi.

Kładąc teraz

$$a = b = c = \dots = k = L,$$

jeżeli  $D$  wyobraża liczbę wykładników znajdujemy

$$L \cdot D = m!, \quad \text{lub} \quad D = \frac{m!}{L},$$

co pokazuje że liczba  $D$  różnych wartości funkeyi  $v$  jest dzielnikiem liczby  $m!$

**Twierdzenie XIII.** Równe wartości funkeyi odpowiadają przemianom niezmiennym się od podstawień przez nie oznaczonych.

Niech

$$(1) \quad P_1, P_2, P_3, \dots, P_t$$

będą przemianami odpowiadającymi wszystkim równym wartościom funkeyi wyobrażonym przez szereg następujący

$$(2) \quad f(P_1), f(P_2), f(P_3), \dots, f(P_t).$$

Niech  $P_1^{(\alpha)}$  będzie przemianą odpowiadającą różnej wartości funkeyi od tej jaką teraz uważamy. Po zastosowaniu podstawienia wyrażonego przez symbol  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_1^{(\alpha)} \end{pmatrix}$  do przemian (1) i do funkeyi (2), znajdziemy

$$(3) \quad P_1^{(\alpha)}, P_2^{(\alpha)}, P_3^{(\alpha)}, \dots, P_t^{(\alpha)},$$

$$(4) \quad f(P_1^{(\alpha)}), f(P_2^{(\alpha)}), f(P_3^{(\alpha)}), \dots, f(P_t^{(\alpha)}).$$

Przemiany (3) odpowiadają wartościom funkeyi (4). Ponieważ wartości funkeyi (2) są równymi



sobie, z określenia wypada, że i wartości funkcyi (4) są także sobie równemi. Jeżeli zatem przemiana  $P_1^{(a)} = P_\lambda$  któręjbądź z przemian (1), szereg wartości funkcyi (4) jest szeregiem wartości funkcyi (2) inaczéj uporządkowanym; a ztąd już wypada, że szereg przemian (3) jest, w takim przypadku, szeregiem przemian (1) inaczéj uporządkowanym. Przemiany więc (1) są niezmiennającemi się od podstawień przez nie oznaczonych.

Z twierdzenia tego wypada, że pisząc w równaniu

$$D = \frac{m!}{L}$$

za  $L$  któręjbądź liczbę następu [17], otrzymamy wyrażenie liczby różnych wartości funkcyi.

19. Jeżeli funkcyja ma mniej jak  $m!$  różnych wartości, pomiędzy przemianami wszystkiemi, musi zachodzić przynajmniej jedna  $P_\lambda$ , i taka, że podstawienie  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_\lambda \end{pmatrix}$  wartości téj funkcyi nie zmienia. Podług twierdzenia XI funkcyja nasza ma jedną tylko wartość dla wszystkich przemian nierozdzielnych względem tego podstawienia, a podług twierdzenia poprzedniego, wszystkie jéj równe wartości odpowiadają przemianom niezmiennającym się od podstawień przez nie oznaczonych. Rozwiązanie więc naszego zadania sprowadza się do dwóch następujących :

a) Mając dane podstawienia  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_\lambda \end{pmatrix}$  znaleźć wszystkie inne takie, któreby do tego zastosowane, nie zmieniły jego natury względem tych samych ilości.

b) Znalazszy je wszystkie, wybrać z nich te tylko, względem których przemiany nierozdzielne, i przemiany nierozdzielne względem podstawienia danego  $\begin{pmatrix} P_1 \\ P_\lambda \end{pmatrix}$  mają jedną tylko przemianę wspólną  $P_1$ .

Taki bieg rzeczy nadaliśmy naszéj pracy.